

Září s Fagronem

Newsletter 09/2017



Dovolená je za námi a my vám s příchodem babího léta posíláme informace o nových položkách v sortimentu.

Věříme, že jste již zaregistrovali na některou z mnoha vzdělávacích akcí, které se připravují a těšíme se na setkání s vámi na některé z nich, například v Brně, Plzni nebo Praze.

Pohodové dny přeje

Váš Fagron

Fagron Academy



S přicházejícím podzimem je čas přemýšlet o vzdělávacích akcích. S komorovými semináři „Magistraliter příprava v lékárnách“ za vámi zavítáme

do Brna (21.9.),

do Plzně (4.10.)

a do Prahy (5.10.).

Přihlaste se na tyto vzdělávací akce včas na lekarnici.cz, kapacita sálů je omezena.

Pomocné látky v evropské kvalitě za výhodné ceny

Ethanol EURO denaturovaný 96%, 5l / 4kg

Ethanol EURO je obecně denaturovaný líh dle platných českých a evropských norem (denaturováno směsí methylethylketon, izopropanol, bitrex). Certifikáty a další dokumenty dostupné na vyžádání.

Xylen EURO, 5l

Xylen patří mezi široce používané průmyslové rozpouštědlo, ve zdravotnictví je využíván především při přípravě laboratorních vzorků (čištění tkání apod.).

Aceton EURO, 5l

Aceton je bezbarvá kapalina specifického zápachu, hořlavá, s vodou neomezeně mísitelná. Používá se jako rozpouštědlo organických látek, výchozí surovina pro chemické syntézy nebo k fixaci tkáňových vzorků.

Obsah:

Semináře

Nourisil™

MediSpend™

Na co se ptáte

Aktuálně v nabídce

Tento newsletter vydává

Fagron CZ

Fagron a.s.

Holická 1098/31m

779 00 Olomouc

inovace@fagron.cz

zelená linka 800 138 759



„NA CO SE NÁS PTÁTE?“

Dotaz: Mám zájem i o přípravu přípravků se samotným tretinoinem a ráda bych si upřesnila, jaké jsou vhodné trituratione pro navažování malých množství tretinoinu při přípravě krému a do jakých obalů je vhodné přípravky adjustovat? A dále jaké ochranné pomůcky je vhodné při přípravě použít?

Odpověď: Při přípravě krému s tretinoinem se doporučuje 2% trituratione ve vazelině (na rozdíl od BasiFarm® cremoru nebo LanetFarmu® neobsahuje vodu a je proto stabilnější), použitelnost je dle NRF jeden rok, viz rozpis níže:

Lipophiles Tretinoin-Rezepturkonzentrat 2% (NRF S.29.)

Tretinoin	2,0 g
Butylhydroxytoluol-Paraffinkonzentrat 2 %	2,0 g
Weißes Vaseline	ad 100,0 g

Informace o adjustaci je převzata z NRF, kde jsou jako vhodný obal uváděny hliníkové tuby. Ideální je přípravu provést v unguatorovém kelímku a následně z něj krém pohodlně přeplnit do tuby.

Pokud navažujete práškový tretinoin (např. do trituratione), určitě je vhodné použít respirátor nebo štít. Pokud pracujete s vazelinovou triturací, tak stačí rukavice.

S tretinoinem by neměly pracovat těhotné (či potencionálně těhotné) ženy.

Další informace o přípravě s touto léčivou látkou naleznete například ve článku: Láznicka, Bucharová. Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu. Dermatol. praxi 2017; 11(1): 39–42.

Zdravotnické prostředky Fagron

NOVINKA - MediSpend™ Lemon

MediSpend™ Lemon ocení Vaši pacienti, kteří mají problémy s polknutím léků. Sirupovitá tekutina s krémovou konzistencí usnadní administraci léků seniorům, pacientům s poruchami polykání i dětem. Příjemná citronová příchut' navíc pomáhá maskovat nepříjemnou chuť léku.

Pro další informace zavítejte do našich Produktových inovací.

Nourisil™ MD

Silikonový gel na jizvy Nourisil™ MD nabízí optimální řešení pro pacienty s čerstvými i staršími jizvami. Pravidelná aplikace gelu podporuje zplošťování jizvy, zmírňuje začervenání a svědění v okolí jizvy.

30g balení umožňuje dostatečně dlouhou aplikaci pro pacienty s popáleninami a jizvami po poraněních či chirurgických zákrocích. Vaši pacienti jistě ocení i příznivou cenu přípravku.



Aktuálně ze sortimentu

603580 – Lahev kapaci 25ml
Bralen / 50ks v bal

603581 – Lahev kapaci 50ml
Bralen / 50ks v bal



Ether solvens, 500 ml

Čirá bezbarvá těkavá kapalina, snadno zápalná. Je dobře rozpustný ve vodě, je mísitelný s lihem 96% a s mastnými oleji.

Zařadili jsme na základě Vašich požadavků menší balení etheru pro přípravu pod katalogovým číslem 609812.

Tacrolimus monohydricus, 2g

Látka s imunosupresivním účinkem k dispozici v malých 2 gramových baleních pro přípravu sirupů či k rozplnění. Vhodné především pro nemocniční lékárny a lékárny s onkologickými pracovišti.

• Provedené stability se základy SyrSpend® SF PH4: 0,5 a 1,0 mg/ml.